


# 定期予防接種一覧表

※標準的な接種期間に受けましょう。



種類	ワクチン	予防する病気	予診票の色(枚数)	※標準的な接種期間	接種可能な年齢	接種の目安													
						0歳						1歳		2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳半
						2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	0~3か月	6か月				
ヒブワクチン(4回)	不活化	ヒブによる髄膜炎	若竹色(4枚)	■初回①~③ 2~7か月(1歳までに完了) ■追加 3回目終了後7~13か月の間隔をおく	2か月~5歳の誕生日の前日まで	初回①	初回②	初回③	27日以上の間隔をあけて3回接種。	<b>&lt;注意&gt;</b> ヒブ、肺炎球菌ワクチンを7か月以降に初回接種する場合は裏面を参考にしてください。		追加	初回③終了後、7か月以上あけて1回接種。						
肺炎球菌ワクチン(4回)	不活化	肺炎球菌性髄膜炎	青色(4枚)	■初回①~③ 2~7か月(1歳までに完了) ■追加 12~15か月に至るまで	2か月~5歳の誕生日の前日まで	初回①	初回②	初回③	27日以上の間隔をあけて3回接種。			追加	初回③終了後60日以上あけて生後12か月以降に1回接種。						
B型肝炎(3回)	不活化	急性肝炎慢性肝炎	グレー(3枚)	2~9か月に至るまで	2か月~1歳の誕生日の前日まで	1回目	2回目	27日以上の間隔をあけて2回接種。		3回目	1回目から139日以上の間隔あけて1回接種。								
4種混合(4回)	不活化	ジフテリア 百日ぜき ポリオ 破傷風	淡黄色(4枚)	■初回①~③ 3~12か月に達するまで ■追加 初回終了後12~18か月までの間隔をおく	3か月~7歳6か月の前日まで		初回①	初回②	初回③	20日以上の間隔をあけて3回接種。		追加	初回③終了後、6か月以上あけて1回接種。						
BCG(1回)	生	結核	ブルー(1枚)	5~8か月に達するまで	1歳の誕生日の前日まで			1回目	1歳までに忘れずに接種しましょう。										
MR(麻しん・風しん)(2回)	生	はしか 三日はしか	白茶色(2枚)	■I期 1~2歳に至るまで(2歳誕生日の前日) ■II期 6歳になる年度(年長児の年)	1歳~3歳の誕生日の前日まで				感染力が高いので、1歳になったらすぐ接種しましょう。		I期	年長児の学年のできるだけ早いうち(4~6月)に接種しましょう。			II期				
水痘(2回)	生	水ぼうそう	サーモン(2枚)	■1回目 12~15か月に達するまで ■2回目 1回目終了後6~12か月までの間隔をおく	1歳~3歳の誕生日の前日まで						1回目	2回目	1回目から3か月以上の間隔をあけて1回接種。						
日本脳炎(I期)(3回)	不活化	日本脳炎	藤色(3枚)	■初回①② 3~4歳に達するまでの期間 ■追加 4~5歳に達するまでの期間	7歳6か月の前日まで				1期初回①から6日以上の間隔をあけて2回目接種 1期追加:1期初回②終了後6か月以上あけて1回接種。			初回①	初回②	追加					

※2種混合II期(1回)は11歳~13歳未満の者に接種するため、12歳を迎える年度の4月に郵送します。

※日本脳炎II期(1回)は9歳~13歳未満の者に接種するため、9歳の誕生日の末日に郵送します。

★接種間隔の起算日は、接種した日の翌日です。

★別の種類のワクチンを接種する場合、不活化ワクチンを接種した日の翌日から6日以上あける。生ワクチンは接種した翌日から27日以上あける必要があります。

★長期にわたり療養が必要な疾患により期間内に接種ができない場合は、下記までご相談ください。

【問い合わせ】七尾市健康福祉部健康推進課 TEL53-3624

参考文献:2018年度版 予防接種ガイドライン