

～4種混合ワクチン、ヒブワクチンを接種される方～

種類	予防する 病気	※標準的な接種期間	定期接種の 対象年齢	接種の目安																
				0歳									1歳		2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳半
				6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	0~3 か月	6 か月						
ヒブ ワクチン (4回)	不 活 化	ヒブによる髄膜炎	■初回①~③ 2~7か月（1歳までに完了） ■追加 3回目終了後7~13か月の 間隔をおく	2か月~ 5歳の誕生日の前日まで	初回①	初回②	初回③	27日以上の間隔をあけて3回接種。					追加	／	初回③終了後、7か月以上あけて1回接種。					
					／	／	／													
4種混合 (4回)	不 活 化	ジフテリア 百日ぜき ポリオ 破傷風	■初回①~③ 2~12か月に達するまで ■追加 初回終了後12~18か月までの 間隔をおく	2か月~ 7歳6か月の前日まで	初回①	初回②	初回③	20日以上の間隔をあけて3回接種。					追加	／	初回③終了後、6か月以上あけて1回接種。					
					／	／	／													

～HPV(子宮頸がん)ワクチンを接種される方～

種類	予防する 病気	予診票の 色 (枚数)	ワクチンの種類	定期接種の対象年齢	接種回数	接種の間隔		標準的な接種間隔	
HPV ワクチン	不 活 化	子宮頸が ん	サーバリックス(2価)	12歳となる日の属す る年度の初日～16 歳となる日の属する 年度の末日まで	3回	1回目 2回目：1回目から1か月以上 3回目：1回目から5か月以上、かつ 2回目から2か月半以上		1回目 2回目：1回目から1か月以上 3回目：1回目から6か月以上	
						1回目 2回目：1回目から1か月以上 3回目：2回目から3か月以上		1回目 2回目：1回目から2か月後 3回目：1回目から6か月以上	
			ガーダシル(4価)						
			シルガード9(9価) ※15歳以上の場合						
			シルガード9(9価) ※初回を15歳未満で 接種した場合	12歳となる日の属す る年度の初日～15 歳の誕生日の前日	2回	1回目 2回目：5か月以上 (5か月未満で接種した場合、3回目の接種が必要となります。)		1回目 2回目：6か月以上	

～ヒブ・肺炎球菌ワクチンの1回目を生後7か月以降に接種される方～

※ヒブ、肺炎球菌ワクチンは接種開始の年齢により接種回数が異なります。接種開始年齢から今後の接種時期を確認してください。

種類	予防する 病気	予診票の 色 (枚数)	接種可能な年 齢	接種開始 年齢	接種回数	0歳					1歳		2歳	3歳	4歳	5歳
						7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	0～3か月	6か月				
ヒブ ワクチン	不 活 化	ヒブによる 髄膜炎	若竹色 (4枚)	2か月～ 5歳の誕生日 の前日まで	7か月～ 1歳未満	3回	1回目	2回目	1回目から27日以上の間隔を空けて1歳の誕生日の前日までに1回接種。 (計2回)			追加	2回目終了後、7か月以上において1回接種。			
				1～5歳未満	1回					1回目						
肺炎球菌 ワクチン	不 活 化	肺炎球菌 性髄膜炎	青色 (4枚)	2か月～ 5歳の誕生日 の前日まで	7か月～ 1歳未満	3回	1回目	2回目	1回目から27日以上の間隔を空けて1歳の誕生日の前日までに1回接種。(計2回)			追加	2回目終了後60日以上空けて生後12か月以降に1回接種。			
					1～2歳未満	2回					1回目	2回目	1回目から60日以上の間隔において1回接種。			
					2～5歳未満	1回							1回目			