


# 新型コロナワクチン接種のお知らせ

現時点で、特例臨時接種としての新型コロナワクチン接種ができる期間は  
令和5年3月31日までです。まだ接種をしていない人は早めの接種をご検討ください。



接種は、感染症予防の効果と副反応のリスクなど新型コロナワクチンについて十分に理解した上で、**本人および保護者の意思に基づいて判断してください**。周りの人に接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応を取ったりしないでください。

## オミクロン株対応2価ワクチンの効果

10月から使用されているオミクロン株対応2価ワクチンの追加(3~5回目)接種は、従来の1価ワクチンを上回る重症化予防効果と、短期間の可能性はあるものの、オミクロン株に対する感染・発症予防効果が期待されています。

## 接種後の副反応の症例

接種後は、次の症状(副反応)が現れる場合がありますが、ほとんどが2~3日以内に回復しています。

【接種直後】 ごくまれにアナフィラキシーショック、血管迷走神経反射(気を失うなど)

【接種後~数日】

● 生後6カ月~11歳

発現割合	生後6カ月~1歳	2歳~4歳	5歳~11歳
50%以上	機嫌が悪い(イライラ)		注射部位の痛み、疲労
10~50%	食欲がなくなる、眠たくなる様子、注射部位の痛み・赤み	注射部位の痛み・赤み、疲労	注射部位の赤み・腫れ、頭痛、筋肉痛、寒気
1~10%	発熱、注射部位の腫れ	下痢、発熱、頭痛、注射部位の腫れ、嘔吐、寒気、筋肉痛、関節痛	下痢、発熱、嘔吐、関節痛

● 12歳以上(3回目、4回目、5回目)

発現割合	ワクチンの種類		
	ファイザー社	モデルナ社	武田社(ノババックス)
50%以上	注射部位の痛み	注射部位の痛み、疲労	注射部位の痛み、疲労、筋肉痛
10~50%	疲労、筋肉痛、関節痛、頭痛、寒気	筋肉痛、関節痛、頭痛、寒気、リンパ節の腫れ・痛み、嘔吐	関節痛、頭痛、だるさ、嘔吐、発熱、注射部位の腫れ・しこり・赤み
1~10%	発熱、下痢、注射部位のしこり・赤み、嘔吐	発熱、注射部位の腫れ・しこり・赤み	発熱、下痢、嘔吐、関節痛

◆ワクチン接種後4日程度の間には胸の痛み、動機、息切れ、むくみなどの症状が見られた場合は、心筋炎・心膜炎が疑われますので、速やかに医療機関を受診し、ワクチンを受けたことを伝えてください。一般的には、入院が必要となりますが、多くは安静によって自然回復します。

【接種後の相談先】

①接種医療機関、②かかりつけ医、③石川県発熱患者等受診・コロナワクチン副反応相談センター(☎0120-540-004)のいずれかにご相談ください。

※令和4年12月16日時点の情報です。最新の情報は、厚生労働省または市ホームページをご覧ください。

厚生労働省HP  
有効性・安全性について



厚生労働省Q&A  
安全性と副反応



問 健康推進課 ☎53-3623